

Les enquêtes chasse en Guyane


De 2000 à 2018 :
21 000 prises sur plus
de 7 000 sorties de chasse

Les enquêtes chasse sur les oiseaux forestiers

Deux périodes étudiées :
2000 - 2007 et 2015 - 2018

Plus de 5 000 prises d'oiseaux sur environ
2 000 sorties de chasse

4 régions étudiées



Ces fiches présentent les pratiques des chasseurs volontaires ayant participé aux enquêtes. Elles ne sont pas représentatives de l'ensemble des chasseurs guyanais. Pour cette raison, les différentes périodes peuvent refléter des profils de chasseurs différents.

Vous chassez et souhaitez participer à
l'amélioration des connaissances sur la
faune guyanaise ?

Participez à notre enquête !

<https://guyane.ofb.fr/espace-enqueteur>

Remerciements

L'Office Français de la Biodiversité (OFB) tient à remercier les **médiateurs** ainsi que les **nombreux chasseurs qui se sont portés volontaires** pour transmettre les informations relatives à leurs pratiques. C'est grâce à leur précieuse collaboration que les résultats présentés dans ce livret ont pu être obtenus.

Financements

Un projet co-financé par l'Union européenne et la Direction Générale des Territoires et de la Mer



Les **fonds européens de développement régional (FEDER)**, appelé **FEDER-FSE en Guyane française**, ont pour vocation de renforcer la cohésion économique et sociale entre les territoires de l'Union européenne.

Ce dépliant ne constitue pas une réglementation.
Il est destiné à encourager les pratiques de chasse responsables.

www.guyane.ofb.fr

RÉSULTATS D'ENQUÊTES AUPRÈS DE CHASSEURS
EN GUYANE ET ÉCOLOGIE DES ESPÈCES

TINAMOUS

Perdi-poul
Inha bum
Niam
Inam
Namu




Illustration : Jean-Pierre PENNEZ - Mise en page et impression : BCD/OFB 0694 94 69 12 - Ne pas jeter sur la voie publique

Chasse des Tinamous RÉSULTATS D'ENQUÊTES

NORD-OUEST

	2001 - 2005		2016 - 2018
 30 km	- 15 km		15 km
 22 %	+ 7 %		29 %
 6 h	≈		8 h
 281 sorties			1 869 sorties
 12			327
1 chassé sur 25 sorties		1 chassé sur 5 sorties	

Plus de tinamous chassés par sortie entre 2001 et 2018

OUEST


Type de chasse	2006 - 2007	2015 - 2018
 Pour se nourrir	6 km	21 km
 0%		46 %
 5 h		27 h
 1 927 sorties		845 sorties
 211		 740
1 chassé sur 10 sorties		1 chassé à chaque sortie

Les pratiques de chasse différentes entre 2006-2007 et 2015-2018 ne permettent pas d'étudier leur évolution

Les tinamous sont des espèces discrètes mais prisées, en faible déclin dans les zones chassées. Ils sont sensibles à la **présence humaine** (chasse, dégradation forestière...).

POUR UNE CHASSE DURABLE

- ✓ Respecter le quota pour le Grand tinamou et le Tinamou varié qui est de **2 individus maximum** par sortie et par chasseur
- ✓ Limiter la chasse pendant la **période sensible** où les tinamous couvent leurs œufs et élèvent leurs petits
- ✓ Limiter les prises dans **un même groupe** de tinamous



Pour plus de détails sur les résultats d'enquêtes, vous pouvez consulter le livret explicatif sur : <https://guyane.ofb.fr/decouvrir-les-etudes-de-la-faune-sauvage-et-de-la-chasse/les-enquetes-chasse/>



CENTRE

	2000 - 2001		2016 - 2018
 19 km	≈		25 km
 67 %	+ 22 %		89 %
 6 h	+ 9 h		15 h
 260 sorties			543 sorties
 7			10
1 chassé sur 33 sorties		1 chassé sur 50 sorties	

Moins de tinamous chassés par sortie entre 2000 et 2018

EST

	2000 - 2001		2016 - 2018
 30 km	≈		35 km
 86 %	≈		90 %
 45 h	- 26 h		19 h
 306 sorties			472 sorties
 22			4
1 chassé sur 14 sorties		1 chassé sur 125 sorties	

Moins de tinamous chassés par sortie entre 2000 et 2018

TINAMOUS

RÈGLEMENTATION

ESPÈCE
CHASSABLE

2

par sortie
et par chasseur
pour le Grand tinamou
et le Tinamou varié

INTERDITE
AU COMMERCE



STATUT DE CONSERVATION

- Classement UICN* :
« **préoccupation mineure** »
à l'exception du Grand tinamou :
« **quasi-menacé** »
et du Tinamou rubigineux :
« **données insuffisantes** »

Grand tinamou

Tinamus major

STATUT DE CONSERVATION

- Espèce quasi-menacée

Reproduction

- Peut vivre **en solitaire ou en couple**
- **Couleur des œufs** : Bleu intense
- **Lieu de ponte** : contreforts d'un arbre
- Plusieurs femelles peuvent pondre dans le même nid
- **Incubation des œufs** : 17 jours

Alimentation

- En plus des fruits et des insectes, le grand tinamou mange des graviers qui lui permettent de détruire les graines consommées directement dans son estomac. Elles ne sont ainsi pas disséminées.


Chant

- Le chant est entendu toute l'année



Répartition

Habitats



*UICN : Union internationale pour la Conservation de la Nature

**ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (faune et flore à forte valeur patrimoniale)

Les tinamous sont très sensibles à la **dégradation forestière**.

Caractéristiques communes

Reproduction

- **Parades nuptiales** toute l'année, menées par les femelles, qui ont plusieurs partenaires
- **Œufs et couvaion** : œufs pondus directement **sur le sol** de la forêt ; ce sont les **mâles qui couvent les œufs** et prennent soin de leurs petits

Tinamou varié

Crypturellus variegatus

Reproduction

- Espèce principalement **solitaire**
- **Lieu de ponte** : sur le **sol** (1 seul œuf)
- **Incubation des œufs** : 3 semaines
- Le poussin quitte le nid dans les 12 à 24 heures après l'éclosion pour suivre le mâle

Habitat



Répartition



Tinamou cendré

Crypturellus cinereus

Reproduction

- **Couleur des œufs** : « **vieux rose** »
- **Lieu de ponte** : au pied d'un arbrisseau

Chant

Chante toute l'année principalement dans la journée, en particulier à l'aube et au crépuscule. Le chant est identique entre les mâles et les femelles, bien qu'il puisse varier légèrement suivant l'individu

Habitat



Répartition



Plumage

- Leurs couleurs proches de leur milieu naturel leur permettent de **se camoufler** face aux prédateurs

Alimentation

- Principalement des **fruits** et des **graines**, quelques **insectes** (coléoptères, fourmis, termites, cloportes)

Comportement

- Animaux **rapides** et **furtifs**
- Chant entendu toute l'année
- Espèces territoriales

Tinamou rubigineux

Crypturellus brevirostris

STATUT DE CONSERVATION

- Espèce déterminante de ZNIEFF*
- Espèce rare

Chant

Il est entendu à toute heure de la journée, et plus souvent le matin. Les tinamous rubigineux et les tinamous variés chantent parfois en réponse les uns aux autres. Les échanges entre ces deux espèces seraient dus à leurs ressemblances.

Habitat



Répartition



Tinamou soui

Crypturellus soui

Reproduction

- Vit principalement en **couple**
- **Couleur des œufs** : **violacée**
- **Lieu de ponte** : Sur le sol de la forêt (entre 1 et 3 œufs)
- Le poussin quitte le nid dès le premier jour, il se nourrit seul au bout d'une semaine et est capable de voler au bout du 25^e jour.
- Reproduction à partir d'un an.

Habitat



Répartition

